

Знахідки *Barbastella barbastellus* та *Myotis brandtii* у Природному парку «Прип'ятський» (Білорусь)

О. В. Кусьнеж^{*}, В. Ч. Домбровський^{**}, М. В. Скирпан^{*}

^{*} Львівський національний університет ім. І. Франка;
oleksandr.kusnezh@gmail.com, kolya1992@gmail.com; ^{**} Інститут зоології НАН
Білорусі; valdombr@rambler.ru

Рукокрилі залишаються одними із найменш вивчених груп тварин, хоча останніми роками інтерес до них зріс, що пов'язане між іншим, із природоохоронними статусами видів і ареалами, які потребують уточнення реальними знахідками. Міжнародні охоронні статуси підвищують потребу встановлення видового різноманіття рукокрилих на природоохоронних територіях.

Із 14 червня по 4 вересня 2012 р. у Національному парку «Прип'ятський», в рамках підготовки Атласу звірів і птахів цієї природоохоронної території проведено відлови рукокрилих. Окрім інших кажанів (Домбровський та ін., у друці), зловлено одного широкоуха європейського (*Barbastella barbastellus*) та 5 особин нічниці Брандта (*Myotis brandtii*). 16 серпня 2012 р. у місцезнаходженні з координатами 52,00 N та 27,86 E, зловлено самця *B. barbastellus* (R = 39,6 мм) і самку *M. brandtii* (R = 35,3 мм). Ще чотири особини *M. brandtii* зловлено 18 серпня 2012 р. за координатами 52,00 N та 27,95 E (самець з R = 35,5 мм, три самки з R = 34,1; 34,9; 37,2 мм). Особини цих видів зловлено на лісових листяних островах поблизу низинних і перехідних боліт. Після огляду, зняття морфометричних показників, фотографування і записів ультразвукових сигналів тварин відпускали. Обидва види – *B. barbastellus* та *M. brandtii* – внесені до Білоруської Червоної книги, охороняються Бернською і Боннською конвенціями та Угодою про збереження популяцій Європейських видів кажанів (EUROBATS). *B. barbastellus*, також має категорію NT у списку МСОП та статус VU згідно з Європейським червоним списком.

Знахідка *B. barbastellus* є унікальною, зважаючи на те, що це перша реєстрація цього виду у Центральному Поліссі. Усі попередні знахідки були прив'язані до крайньої західної частини Білорусії та місць зимівлі у різних підземеллях та у Брестській фортеці (Демянчик, Демянчик, 2000; Красная книга РБ, 2004). Подібна ситуація – із *M. brandtii*, знахідки якої, за літературними даними, прив'язані до заходу країни (Красная книга РБ, 2004). Недавня знахідка поодинокі особини цього виду у Петриківському районі (Shpak, 2010) змістила межу відомого нам ареалу в Білорусі далеко на схід. Отримані результати дозволяють стверджувати, що особини даного виду є нерідкісними у натуральних заболочених біотопах Прип'ятського Полісся.

Велика різноманітність біотопів та старовікових лісів надають сприятливі умови для проживання багатьох видів рукокрилих, тому дослідження хіроптерофауни ПП «Прип'ятський» і Полісся загалом залишаються актуальними.