

Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Серия «Биология, химия» Том 17 (56). 2004 г. № 2. С. 186–191.

УДК 693.113.3

ДИНАМИКА БОБРОВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ В МЕЛИОРИРОВАННОЙ ПОЙМЕ

Скоробогатов Е. В., Атемасова Т. А., Атемасов А. А.

В Харьковской области бобр речной (*Castor fiber* L., 1758) считался исчезнувшим с 1851 г. [11]. Единичные попытки интродукции животных на Харьковщине в 1929 г. [3] успеха не принесли. В 1972–1975 гг. в соседней Полтавской обл. на р. Ворскла и её притоках (в т.ч. р. Мерла) в районе с. Диканька, Опешня и Котельва было выпущено несколько групп бобров (Волох А.М., устное сообщение, предоставлены материалы). Осваивая местные водоёмы, в процессе дальнейшего естественного расселения животные распространились далее по Мерле и Ворскле до Краснокутского р-на Харьковской обл., где в настоящее время бобры отмечены на Мерле с её притоками Мерчиком и Сухим Мерчиком [7, 10], на р. Коломак (Скоробогатов, Атемасова, в печати), а также на притоках Ворсклы — рр. Берёзовке и Рябиновке. Бобровая колония, обосновавшаяся с 1981 г. в мелиорированной пойме р. Мела напротив г. Краснокутск, — результат этого расселения.

С 1991 г. сотрудниками Харьковского национального университета осуществляется мониторинг Краснокутской бобровой колонии. Наблюдаемый участок занимает площадь 50 км² и включает до 250 км береговой линии реки и каналов. Одна из целей исследований — выяснение влияния различных факторов на размещение бобровых семейных участков, для чего необходимо было выполнение подробного описания исследуемого района поймы. Нами использована карта-схема (1: 10000), где береговая линия всех исследуемых водоёмов и водотоков была разделена на 100-метровые отрезки (по причине высокой степени дифференциации описываемых территорий по всем учитываемым характеристикам), которые характеризовались по общей схеме с занесением требуемых данных в учётно-таксационную форму.

При регистрации бобровых погрызов, убежищ или других следов их жизнедеятельности на каждую учтённую точку заполнялась аналогичная форма-описание, дополняющая сведения о данном отрезке. Береговая линия характеризовалась по следующим показателям: гидрорежим, ширина и глубина водотока; характер берегового вала (крутизна, высота, механический состав грунта); степень антропогенного воздействия (удалённость от населённого пункта и дорог, тип землепользования); кормовая база береговой полосы⁶ (наличие, полнота и видовой состав прибрежной высшей водной растительности⁷ и древесно-

⁶ Далее БП.

⁷ Далее ВВР.

ДИНАМИКА БОБРОВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ В МЕЛИОРИРОВАННОЙ ПОЙМЕ

кустарниковых растений⁸, ширина БП, удаление от уреза воды, наличие полян). При оценке бобровых угодий применялись методики Пояркова [5], Дунина и Ставровского [1], учёт бобровых поселений осуществлялся с использованием методик Пояркова [5], Соловьёва [9] и Дьякова [2].

По результатам последних полных учётов (в 2000 г.) за прошедшие 9 лет число бобров в колонии увеличилось с 70–80 особей (23 семьи) в 1991 г. до 129–187 особей (34 семьи) в 2000 г., т.е. в 1,8–2,1 раза. Средняя величина семьи за это время увеличилась в 1,5 раза (с 3,2 до 4,9 животных) [8]. Динамика величины бобровых семей в колонии показана в таблице 1.

Таблица 1
Динамика величины бобровых семей с 1992 г. по 2000 г.

Категория [*]	Количество бобровых семей по категориям					
	1 бобр	I — 2 бобра	II — 3–5 бобров	III — 5–7 бобров	IV — 7–9 бобров	V — 9–16 бобров
1991–1992	1	5	10	7	—	—
1999–2000	1	4	20	3	5	1
	Всего					
						23
						34

* — учётная категория бобровой семьи по Пояркову [5].

Отмеченные на обследованном пойменном участке Мерлы поселения бобров отнесены нами к трём категориям: прудовые, русловые поселения малых рек (по Самусенко и Крапивному [6]), а также собственно канальные. В таблице 2 указана плотность бобров для поселений различных типов угодий, при расчёте не учитывалась протяжённость береговой линии, лишённой растительности.

Таблица 2
Плотность распределения бобров в пойме р. Мерла
для поселений различного типа в 1999–2000 гг.

Оценка	Поселения, тип угодий			Освоенная бобром территория (58,1 км)	Вся обследованная территория (240 км)
	прудо-вые	каналь-ные	русло-вые		
особей/1км БП	2,2	5,23	2,38	2,6	0,62

Как наиболее предпочтаемые бобрами участки выделяются магистральные и водосборные каналы, расположенные на границе притеррасной поймы и облесённой 1-й надпойменной террасы (притеррасная речка в ольшаниках) (поселения № 2, 3, 4 и 5). Береговая полоса в таких местах с хорошо развитой ВВР и ДКР зачастую имеет ширину более 10 м, что обеспечивает семейным участкам наилучшие защитные условия и достаточный кормовой запас.

Из зарегистрированных нами в 2000 г. 34 поселений (в 1993 — 23) выделено: русловых — 13 (38 %, в 1993 — 43,4 %), прудовых — 1 (3 %, в 1993 — 8 %),

⁸ Далее ДКР.

канальных — 20 (59 %, в 1993 — 48,9 %). Таким образом, отмечено снижение доли русловых и увеличение доли канальных поселений. Причём, расположение старых русловых поселений практически не изменилось, за исключением небольшой сдвиги границ участков. Увеличение доли и количества канальных поселений произошло за счёт разделения существовавших ранее “материнских” семейных участков и обособления части бывших кормовых площадок в качестве самостоятельных поселений (№ 4 и 7; 12 и 13; 21 и 22 и 24; 32 и 33; 30 и 31; 8 и 34). Кроме того, 4 из 11 канальных поселений, зарегистрированных в 1991–1992 гг., полностью сменили семейные участки к 2000 г., т.к. свели всю ДКР на участке.

Основная концентрация русловых поселений на Мерле к 2000 г. также сохранилась между 4 и 6 шлюзами — 10 шт. (30 % от общей численности). Канальные поселения в наибольшей степени сгруппированы на отрезке от границы с Полтавской областью и до шлюза № 3 (напротив с. Колонтаев) — 8 шт. (24 % от общей численности), на остальной территории бобровой колонии они диффузно разбросаны и не образуют значимых скоплений.

Закономерно возникает вопрос: какова же перспектива дальнейшего роста у каждой бобровой семьи и, соответственно, у колонии в целом? На основании данных таксационного описания угодий все учтённые бобровые семьи были разделены нами на перспективные и неперспективные (табл. 3, 4).

Таблица 3
Распределение бобровых семей различного состава
по группам перспективности (1999–2000 гг.)

Формула семьи: сеголетки -годовики -взрослые	Неполные семьи*					Полные семьи*						Итого	
	0-0-1	0-1-0	0-0-2	0-1-2	0-2-2	1-1-2	2-0-2	2-1-2	2-2-2	3-1-2	4-2-2		
Кол-во семей	1	1	1	1	3	2	8	7	3	1	5	1	34
Перспективные	1	—	—	1	—	1	3	3	—	—	5	—	14
Неперспективные	—	1	1	—	3	1	5	4	2	1	3	1	20

* — Средняя бобровая семья обычно состоит из 2 родителей, 1–4 (1–2) годовиков и 1–4 (1–2) сеголеток. Такая семья полная [4, п. 32.4].

Для определения возможности дальнейшего роста семьи и, соответственно, отнесения конкретной бобровой семьи к той или иной группе, необходимо было получить полное представление о занимаемом ею семейном участке и прилегающей территории — наличие и доступность основных зимних кормов, качество защитных и гнездовых условий, другие экологические особенности биотопа, степень антропогенного воздействия на участок. Все эти характеристики оценивались в баллах. На основании суммарных показателей характеристик заселённый семейный участок относили к пригодным или малопригодным.

ДИНАМИКА БОБРОВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ В МЕЛИОРИРОВАННОЙ ПОЙМЕ

Таблица 4

Число бобров по поселениям, согласно данным учётов 1999–2000 гг.,
и экологически допустимая численность

№ посе- ления	Число особей в семье			Возможность роста семьи, (особей)	Показатель антропоген. влияния	Основной фактор беспокойства	Перспективные посе- ления	
	Экологичес- ки допустимое		по данным учётов					
	общ.	сред.						
1	2,20	2	3–5	4	-2	1,08	Сенокос	H/p
2	3,03	3	7–9	8	-5	0,51	Лесопользование	P
3	5,10	5	3–5	4	+1	0,64	Сенокос	P
4	5,65	6	3–5	4	+2	1,91	Сенокос, лесопольз.	P
5	0,83	1	3–5	4	-3	0,40	Выпас, лесопольз.	H/p
6	0,17	0	3–5	4	-4	1,83	Сенокос	H/p
7	7,70	8	3–5	4	+4	1,88	Сенокос	P
8	0,	0	2	2	-2	1,38	Пашня	H/p
9	1,65	2	3–5	4	-2	1,29	Пашня	H/p
10	2,73	3	3–5	4	-1	3,88	Пашня, лесопольз.	P
11	0,35	0	1	1	-1	1,64	Сенокос, лесопольз.	P
12	7,54	8	3–5	4	+4	2,75	Сенокос, лесопольз.	H/p
13	2,75	3	2	2	+1	5,50	Выпас	H/p
14	0,83	1	3–5	4	-3	5,58	Сенокос	H/p
15	8,75	9	5–7	6	+3	2,60	Сенокос	H/p
16	5,73	6	2	2	+4	1,95	Сенокос	P
17	5,78	6	5–7	6	0	2,59	Сенокос	H/p
18	2,75	3	3–5	4	-1	2,95	Сенокос	P
19	5,23	5	5–7	6	-1	2,31	Сенокос	H/p
20	1,65	2	3–5	4	-2	2,98	Сенокос	H/p
21	1,93	2	7–9	8	-6	8,28	Сенокос, лесопольз.	P
22	9,74	10	9–16	12	-2	2,56	Сенокос	H/p
23	2,75	3	3–5	4	-1	2,18	Сенокос, лесопольз.	P
24	3,85	4	3–5	4	0	2,40	Сенокос	H/p
25	6,88	7	7–9	8	-1	2,42	Сенокос	H/p
26	7,70	8	7–9	8	0	2,61	Сенокос	H/p
27	5,78	6	3–5	4	+2	5,73	Сенокос	H/p
28	4,40	4	3–5	4	0	6,70	Выпас	H/p
29	8,05	8	3–5	4	+4	2,51	Выпас	H/p
30	2,75	3	3–5	4	-1	8,21	Сенокос, лесопольз.	H/p
31	4,68	5	3–5	4	+1	1,84	Пашня	H/p
32	2,48	2	3–5	4	-2	3,00	Пашня	H\p
33	4,40	4	3–5	4	0	1,50	Сенокос, лесопольз.	P
34	4,68	5	7–9	8	-3	1,51	Пашня, лесопольз.	P
всего		144		149				

Пригодными для обитания местами считались участки с достаточными кормовыми, защитными и гнездовыми условиями. К малопригодным относились участки, где хотя бы один из этих факторов был слабо выражен. В случае если бобровое поселение располагалось на пригодном участке, но испытывающем высокое антропогенное воздействие (непосредственная близость к населённому пункту, автодороге или мосту с большой нагрузкой и т.п.), то такая семья относилась к категории неперспективных. У нас подобная ситуация сложилась лишь с одной бобровой семьёй (№ 13), обосновавшейся на правом берегу Мерлы в 100 м от большого автомобильного моста и в 200 м от крупного села Колонтаево. Во всех остальных случаях пригодные участки были заселены перспективными семьями.

Из 17 “полных” семей, заселивших малопригодные пойменные участки, 6 обосновались на русловых участках с высокой антропогенной нагрузкой, но достаточными кормовыми и защитными условиями.

Возрастной состав колонии при описании по формуле сеголетки-годовики-взрослые, выражался соответственно 38 % 22 % 40 %. Данная формула колонии подтверждает “оптимальный вариант состава популяции” [1].

Экологически допустимая численность бобров (табл. 4) рассчитывалась по Дьякову [2], Соловьёву [9], Дунину, Ставровскому [1]. Несмотря на то, что в поселении № 5 учётное число животных превышает экологически допустимое, мы отнесли его к перспективным, т. к. для данного участка характерны обильные заросли прибрежной растительности, являющейся дополнительным кормом, однако использование бобрами которой трудно оценить.

Сопоставление результатов пересчётов экологически допустимой численности (144 особи) и усреднённых данных учётов (149 особей), а также уменьшение встречаемости следов жизнедеятельности бобров (в сравнении с 1992–1993 гг.) при ухудшении кормовой базы и занятости всех потенциальных гнездопригодных участков даёт основание говорить о достижении краснокутской колонией бобров к 2000 г. своей максимально допустимой величины. Замечено, что при выборе бобрами места для семейного участка большее предпочтение отдается каналам, особенно с хорошо развитой прибрежной и около водной растительностью. При дефиците территории наблюдается заселение молодыми парами бывших кормовых площадок и их отделение в качестве самостоятельных поселений.

Список литературы

1. Дунин В.Ф., Ставровский Д.Д. Определение ёмкости бобровых угодий в Березинском заповеднике / Заповедники Белоруссии. — Минск, 1982. — В. 6. — С. 90–92.
2. Дьяков Ю.В. Методы и техника количественного учёта речного бобра / Труды Воронежского Гос. заповедника. — 1975. — В.4. — С.160–175.
3. Мілютін М.Г. До питання відновлення річного бобра на Дінці // Український мисливець та рибалка. — 1932. — № 8-9. — С. 7–9.
4. Основы охотустроства Украинской ССР (инструктивно-методические указания по проведению внутрихозяйственного охотустроства).
5. Поярков В.С. Количественный учёт речных бобров // Труды Воронежского Гос. заповедника. — 1953. — Т. 1. — В. 4. — С. 51–76.

ДИНАМИКА БОБРОВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ В МЕЛИОРИРОВАННОЙ ПОЙМЕ

6. Самусенко З.Г., Крапивный А.П. Речной бобр в Белоруссии / 2-я зоологическая конф. Литовской ССР. Вильнюс, 1962. — С. 114–115.
7. Скоробогатов Е.В., Атемасова Т.А. К вопросу о поселениях речного бобра в Харьковской области / Деп. В ОНП НПЭЦ "Верас-Эко" в ин-те зоологии АН Беларуси 7.11.1993 № 368. — Минск, 1993. — 10 с. (рус.).
8. Скоробогатов Е.В., Атемасова Т.А. Демографические процессы в популяции европейского бобра (*Castor fiber* L.) в трансформированной экосистеме / 1-я Междунар. науч. конф. "Структура и функциональная роль животного населения в природных и трансформированных экосистемах", Днепропетровск, 17–20 сент., 2001 г.: Тез. докл. — Днепропетровск, 2001. — С. 209–210.
9. Соловьёв В.А. Количественный учёт бобра методом измерения ширины следов резца на древесных погрызах // Учёные записки Рязанского государственного педагогического института. — 1971. — Т. 105. — С. 110–125.
10. Токарский В.А., Карташов А.В., Зубатов Ю.М., Козыра П.С. Поселения речного бобра (*Castor fiber*) на Северо-Востоке Украины // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Т.Шевченко. Розд. "Біологічні науки". — Луганськ, 2001. — № 11. — С. 104–109.
11. Шарлемань М. Бобер (*Castor fiber* L.) минулого і нашого часу // Зоологічний журнал України. Київ: Держ. видавництво, 1921. — Ч. 2. — С. 5–15.

Поступила в редакцию 14.05.2004 г.