

КРАСНАЯ КНИГА УКРАИНЫ

Численность редких и охраняемых видов млекопитающих в заповедном массиве «Стрельцовская степь» [Abundance of rare and threatened mammal species in the reserved area "Streltsivskij Steppe"]. — Данные по численности животных собраны в 1986–1998 гг. Исследования проводились на территории заповедника, в его охранной зоне и на участках, непосредственно прилегающих к ней. Встречи животных и следы пребывания отмечались на картосхеме, после обработки данных определялась численность животных. Ёж ушастый (*Erinaceus auritus* Gmelin, 1770) за 12 лет наблюдений ни разу не встречен. Мышовка степная (*Sicista subtilis* Pallas, 1733) при проведении отловов мышевидных грызунов составляет до 25% от числа пойманных зверей (в зарослях кустарников). Тушканчик большой (*Allactaga jaculus* Pallas, 1778) в небольшом количестве встречается на пастбищах в охранной зоне. Следы горностая (*Mustela erminea* L., 1758) ежегодно встречались зимой на снегу; осенью 1998 г. обнаружены свежие останки горностая (в зимнем меху). Хорь светлый (*Mustela evermanni* Lesson, 1827) — обычный для заповедника вид, плотность поселения которого составляет в среднем 7,6 особей на 1000 га. В 1995 г. отмечена максимальная плотность вида — 11,5 ос. на тыс. га, но в дальнейшем отмечено резкое падение численности вида. В течение двух последующих зим (1996/1997 и 1998/1999) спорадически отмечался след одной особи, т. е. плотность обитания составила менее 1,9 ос. на 1000 га. Явных причин столь резкого и продолжительного снижения численности не выявлено. В охранной зоне заповедника вдоль р. Черепача располагаются 2 охотничьих участка норки европейской (*Mustela lutreola* L., 1761); систематически фиксируются следы жизнедеятельности, часты визуальные встречи животных. Перевязка (*Vormela peregusha* Gьldenstaedt, 1770) за 12 лет наблюдений отмечена трижды: в 1986, 1996 и 1997 гг. Все встречи этого редкого вида хорей произошли на заповедных участках. В 1991–1992 гг. отмечен рост численности барсука (*Meles meles* L., 1768). В заповеднике вновь заселена старая барсучья нора (1991 г.). В 1998 г. на протяжении 16-километрового маршрута по балкам, прилегающим к охранной зоне, обнаружено 7 жилых нор барсука. В 1996 г. на р. Меловая (у с. Ново-Стрельцовка) местными охотниками случайно добыта выдра (*Lutra lutra* L., 1758). Достоверно местообитание корсака (*Vulpes corsac* L., 1758) установлено только для охранной зоны. В разные годы систематически наблюдали самих животных и их следы, а в 1995 и 1998 гг. отмечены выводки. — **Е. Н. Боровик** (Луганский природный заповедник НАН Украины, Луганская обл.).

Бібліографія

- Боровик Е. Н. Численность редких и охраняемых видов млекопитающих в заповедном массиве «Стрельцовская степь» // Вестник зоологии. — 1999. — Том 33, № 4–5. — С. 80.
- Borovik E. N. Abundance of rare and threatened mammal species in the reserved area "Streltsivskij Steppe" // Vestnik zoologii. 1999. Vol. 33, № 4–5, p. 80.